

Identification de la coccinelle asiatique *Harmonia axyridis* Comparaison avec les coccinelles indigènes communes

- *Harmonia axyridis* est de coloration très variable. Les formes les plus courantes en Europe sont illustrées ci-dessous. Les caractéristiques permettant de la distinguer des coccinelles indigènes sont:
 - La taille, plus grande que la majorité des espèces indigènes: 6-8 mm
 - Le dessin du pronotum (partie entre la tête et les élytres). Chez les formes claires, le pronotum est clair avec un dessin noir en forme de « W » ou de pattes de chat. Chez les formes noires, le pronotum est noir avec deux bandes extérieures claires
 - Présence d'un bourrelet plus ou moins visible à l'arrière des élytres



Deux variantes de la forme claire. La couleur varie du jaune au rouge avec de 0 à 21 points noirs

Deux variantes de la forme noire, à deux ou quatre points rouges

- Parmi les quelques coccinelles indigènes de la même taille qu'*Harmonia axyridis*, les plus courantes sont :



Coccinella 7-punctata
Très courante, surtout sur plantes herbacées
Toujours rouge à 7 points noirs

Anatis ocellata
Sur conifères
15 points noirs généralement cerclés

Myzia oblongoguttata
Sur conifères
Couleur marron clair avec points et lignes claires

Harmonia 4-punctata
Sur conifères
4 ou 16 points
Stries de couleur crème

- *Harmonia axyridis* vit surtout sur les feuillus (mais peut se trouver dans tous les milieux)
Les espèces les plus fréquentes sur feuillus sont:



Adalia 2-punctata
Très commune
Très variable, 2 à 6 points
4-5 mm

Adalia 10-punctata
Très commune
Très variable
3.5-4.5 mm

Halyzia 16-guttata
Orange à 12 ou 16 points blancs
4.5-6 mm

Calvia 14-guttata
Brun-clair à 14 points blancs crème
4-5 mm